

CONSENTIMIENTO INFORMADO

COLOCACION DE SONDA NASOENTERAL



UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PUEDE ASEMSEJARSE A UN VIAJE EN AUTOMÓVIL. TODOS LOS DÍAS SUBIMOS A UN VEHÍCULO SABRIENDO QUE NO HAY GARANTÍA COMPLETA DE QUE LLEGAREMOS A DESTINO. PERO LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTE ES LO SUFICIENTEMENTE BAJA PARA QUE NO PENSEMOS CONSTANTEMENTE EN ELLO. ASÍ PODEMOS DECIR QUE DURANTE LA CIRUGÍA PUEDE APARECER CUALQUIER COMPLICACIÓN INCLUSO NO DETALLADA POR EXTRAÑA QUE PAREZCA, AUNQUE ES MUY POCO PROBABLE QUE ESTO OCURRA.

DE ACUERDO AL ART. 2, INC.F) DE LA LEY 26.529 DE OCTUBRE/2009 **MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y PRESTO MI CONSENTIMIENTO** PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO

Paciente	DNI	Firma	Fecha

La intervención requiere la administración de anestesia general y es posible que durante o después de la intervención se requiera la administración de sangre o hemoderivados, cuyos riesgos advertirán los servicios de Anestesia y Hematología oportunamente.

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROCESO

Es una Técnica endoscópica que permite la colocación de una sonda en el intestino delgado con intención diagnóstica o terapéutica. El procedimiento se realiza siempre con indicación del médico especialista. Se introduce un endoscopio de calibre convencional por vía oral, como en una gastroscopia normal y se agarra con una pinza de cuerpos extraños la sonda previamente introducida por el orificio nasal. Una vez se atrapa la sonda con la pinza de cuerpos extraños se progresa con el endoscopio hasta tramos mas profundos del intestino delgado donde se libera la sonda naso-ental.

PREPARACION

Para la colocación de la sonda naso-ental el paciente debe encontrarse en ayunas, para que se encuentre vacío el tracto digestivo superior y disminuir el riesgo de aspiración del contenido gástrico. Es necesario avisar con anterioridad a la prueba de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares (infartos, valvulopatías, asma, etc) existencia de prótesis, marcapasos, medicamentos actuales (aspirina, anticoagulantes u otras), enfermedades infecciosas como hepatitis o cualquier otra circunstancia que pueda alterar la tecnica y la evolucion posterior del paciente.

RIESGOS

A pesar de la adecuada elección de la tecnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, como laceración de cornetes nasales, hemorragia, laceración del septum nasal, laceración de la pared posterior de la rinofaringe, inflamación de la trompa de Eustaquio, sinusitis, sinequias entre los cornetes y el septum nasal, perforacion, infeccion o sepsis, mediastinitis, aspiracion bronquial, distención y dolor abdominal, hipotensión, nauseas y vomitos, reaccion alergica y flebitis, o excepcionales como arritmias o parada cardíaca, depresión o parada respiratoria, ACV, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirurgico, asi como un minimo riesgo de mortalidad. A pesar de la realizacion adecuada de la tecnica en un porcentaje muy pequeño de pacientes podría no conseguirse el tratamiento perseguido.

SEDACION

La colocación de una sonda naso-ental puede hacer recomendable o necesaria la anestesia tópica nasal. Para ellos puede ser necesario canalizarle una vena para administrar los medicamentos por via intravenosa. Cualquier sedacion conlleva siempre un riesgo de sufrir raras reacciones graves, que dependen sobre todo del estado del paciente.

ALTERNATIVAS

La sonda naso-ental también se puede colocar sin la ayuda de la tecnica endoscopica, pero en este caso es necesario que la motilidad del tracto digestivo superior se encuentre normosuficiente y ademas la sonda tarda mas tiempo en colocarse en la posicion deseada, pues avanza siguiendo los movimientos peristalticos del aparato digestivo. En el caso de que la indicacion de la colocacion de la sonda nasoental sea para la correcta alimentacion del paciente y esta sonda no se colocara existen otros metodos de nutricion a traves de la via parenteral.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

COLOCACION DE Sonda NASOENTERAL

Riesgos en funcion de la
situacion clinica del paciente

Es necesario por parte del paciente, advertir de sus antecedentes de enfermedades, medicamentos actuales o cualquier otra circunstancia. Cualquiera de las complicaciones mencionadas son mas frecuentes si existen enfermedades sobreañadidas.

Aclaraciones
(sólo para llenar por el
médico)

Firmar los que corresponda

Yo..... DE..... años de edad, DNI.....
Declaro que el/La Dr./Dra. me ha explicado que es conveniente y necesario
en mi situación la realización de **Colocacion de Sonda NasoEnteral**

En, a los días de del

.....
Firma paciente

.....
Firma y sello del médico

Sr/Sra..... DE años de edad, DNI
En carácter de representante legal, familia o allegado de paciente Declaro
que el/La Dr./Dra. me ha explicado que es conveniente y necesario la realización
de **Colocacion de Sonda NasoEnteral**

En, a los días de del

.....
Firma apoderado

.....
Firma y sello del médico

Revocación del consentimiento

Revoco el consentimiento prestado en fecha de de
y no deseo proseguir con el tratamiento que doy por finalizado a partir de esta fecha.

En, a los días, del mes de de

.....
Paciente / Apoderado

.....
Firma y sello médico