

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCLEROSIS DE QUISTE RENAL



UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PUEDE ASEMEJARSE A UN VIAJE EN AUTOMÓVIL. TODOS LOS DÍAS SUBIMOS A UN VEHÍCULO SABRIENDO QUE NO HAY GARANTÍA COMPLETA DE QUE LLEGAREMOS A DESTINO. PERO LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTE ES LO SUFICIENTEMENTE BAJA PARA QUE NO PENSEMOS CONSTANTEMENTE EN ELLO. ASÍ PODEMOS DECIR QUE DURANTE LA CIRUGÍA PUEDE APARECER CUALQUIER COMPLICACIÓN INCLUSO NO DETALLADA POR EXTRAÑA QUE PAREZCA, AUNQUE ES MUY POCO PROBABLE QUE ESTO OCURRA.

DE ACUERDO AL ART. 2, INC.F) DE LA LEY 26.529 DE OCTUBRE/2009 **MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y PRESTO MI CONSENTIMIENTO** PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO

Paciente	DNI	Firma	Fecha

La intervención requiere la administración de anestesia general y es posible que durante o después de la intervención se requiera la administración de sangre o hemoderivados, cuyos riesgos advertirán los servicios de Anestesia y Hematología oportunamente.

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROCESO

Se realiza una punción de la cavidad (quiste o linfocele) con anestesia local y se introduce un pequeño catéter a través del cual se vacía el contenido y se introducen sustancias esclerosantes. Estas sustancias actúan en el interior de la pared del quiste, impidiendo, o tratando de impedir nuevamente la formación de líquido. También cabe la posibilidad que durante la intervención sea necesario realizar modificaciones del procedimiento según los hallazgos intraoperatorios a fin de realizar un tratamiento más adecuado.

OBJETIVO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN

Los quistes simples renales son formaciones redondeadas conteniendo líquido claro y de comportamiento benigno. Pueden crecer comprimiendo el tejido adyacente del riñón provocando su atrofia o la obstrucción del sistema colector. El linfocele es el acúmulo de líquido linfático en la pelvis, luego de una linfadenectomía. Son asintomáticas, pero pueden requerir drenaje cuando producen dolor o compresión.

ALTERNATIVAS RAZONABLES A DICHO PROCEDIMIENTO

Las alternativas posibles son la quistectomía abierta, la quistectomía endoscópica percutánea y la marsupialización abierta o laparoscópica del linfocele. Pero en su caso lo más aconsejable es la esclerosis de quiste renal y/o linfocele..

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN

Desaparición de los síntomas. Habitualmente se deja el catéter unos días para comprobar los resultados y eventualmente repetir la inyección de la sustancia, retirandola posteriormente.

RIESGOS FRECUENTES

A pesar de la correcta indicación y la correcta realización de la técnica, pueden ocurrir efectos indeseables.

- Hemorragia
- Infección
- Punción de víceras o asas intestinales, que pueden requerir una cirugía
- Persistencia parcial o total del quiste

RIESGOS EN FUNCION DE LA SITUACION CLINICA DEL PACIENTE

Es necesario por parte del paciente, advertir de sus antecedentes de enfermedades, medicamentos actuales o cualquier otra circunstancia. Cualquiera de las complicaciones mencionadas son mas frecuentes si existen enfermedades sobreañadidas.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCLEROSIS DE QUISTE RENAL

FIRMAR LOS QUE CORRESPONDA

Yo..... DE..... AÑOS DE EDAD, DNI.....
DECLARO QUE EL/LA DR./DRA. ME HA EXPLICADO QUE ES CONVENIENTE Y NECESARIO
EN MI SITUACIÓN LA REALIZACIÓN DE **CIRUGÍA DE ESCLEROSIS DE QUISTE RENAL**

EN, A LOS DÍAS DE DEL

.....
FIRMA PACIENTE

.....
FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

Sr/SRA..... DE..... AÑOS DE EDAD, DNI

EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIA O ALLEGADO DE PACIENTEDECLARO
QUE EL/LA DR./DRA. ME HA EXPLICADO QUE ES CONVENIENTE Y NECESARIO LA REALIZACIÓN
DE **CIRUGÍA DE ESCLEROSIS DE QUISTE RENAL**

EN, A LOS DÍAS DE DEL

.....
FIRMA APODERADO

.....
FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

REVOCO EL CONSENTIMIENTO PRESTADO EN FECHA DE DE

Y NO DESEO PROSEGUIR CON EL TRATAMIENTO QUE DOY POR FINALIZADO A PARTIR DE ESTA FECHA.

EN, A LOS DÍAS, DEL MES DE DE

.....
PACIENTE / APODERADO

.....
FIRMA Y SELLO MÉDICO